



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Cineol Pohl 300 mg

magensaftresistente Weichkapseln

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

Wirkstoff: Cineol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

– Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

– Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

– Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

– Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Cineol Pohl 300 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cineol Pohl 300 mg beachten?
3. Wie ist Cineol Pohl 300 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cineol Pohl 300 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Cineol Pohl 300 mg und wofür wird es angewendet?

Cineol Pohl 300 mg ist ein unterstützendes Arzneimittel zur Schleimlösung bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege.

Zur Kurzzeitanwendung (max. 1 Woche):

Als begleitende Behandlungsmaßnahme bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cineol Pohl 300 mg beachten?

Cineol Pohl 300 mg darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Cineol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Kindern unter 12 Jahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cineol Pohl 300 mg einnehmen.

Kinder

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden klinischen Untersuchungen vor. Das Arzneimittel soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Cineol Pohl 300 mg zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Cineol wird in der Leber abgebaut. Es kann daher nicht

ausgeschlossen werden, dass andere Arzneimittel den Abbau von Cineol in der Leber schwächen oder beschleunigen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Aufgrund von Untersuchungen bestehen gegen den Einsatz von Cineol Pohl 300 mg während der Schwangerschaft und Stillzeit keine Bedenken. Aus allgemeinen Sicherheitserwägungen sollte die Anwendung von Cineol Pohl 300 mg im ersten Schwangerschaftsdrittel unterbleiben.

Aufgrund der lipophilen Eigenschaften des Wirkstoffs Cineol ist anzunehmen, dass es auch in der Muttermilch in geringen Konzentrationen vorliegt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cineol Pohl 300 mg

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Cineol Pohl 300 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Cineol Pohl 300 mg einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 3 x täglich 1 magensaftresistente Weichkapsel entsprechend 900 mg Cineol ein.

22480001/4





Art der Anwendung

Cineol Pohl 300 mg soll eine halbe Stunde vor dem Essen mit reichlich nicht warmer Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) unzerkaut eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Die Anwendung soll als Kurzzeitanwendung (max. 1 Woche) erfolgen. Sollte sich der Krankheitszustand innerhalb dieser Zeit nicht bessern oder sogar verschlimmern, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge Cineol Pohl 300 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen mit Cineol Pohl 300 mg sind bisher nicht bekannt geworden.

Bei Verdacht auf eine Überdosierung mit Cineol Pohl 300 mg benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann entsprechend der Schwere der Vergiftungserscheinungen über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden.

Als mögliche Symptome einer Überdosierung mit Cineol Pohl 300 mg können zentralnervöse Störungen wie Trübung des Bewusstseins, Müdigkeit, Schwäche der Extremitäten, Miosis und in schweren Fällen Koma und Atemstörungen auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Cineol Pohl 300 mg vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Gelegentlich kann es zu Magen-Darmbeschwerden (Übelkeit, Durchfall) kommen.

Selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen (Gesichts-ödem, Juckreiz, Atemnot, Husten) sowie Schluckbeschwerden beschrieben.

Besondere Hinweise

Wenn eine der oben genannten Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt, sollten Sie die Behandlung mit Cineol Pohl 300 mg unterbrechen. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Cineol Pohl 300 mg nicht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Cineol Pohl 300 mg aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25 °C und in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Durchdrückfolie und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Cineol Pohl 300 mg enthält

Der Wirkstoff ist:

1 magensaftresistente Weichkapsel enthält 300 mg Cineol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mittelkettige Triglyceride, Gelatine, Glycerol, Hypromelloseacetatsuccinat, Triethylcitrat, Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbitol (Ph. Eur.), Natrium-dodecylsulfat, Talkum, Dextrin, Glycyrrhizinsäure, Ammoniumsulfat

Wie Cineol Pohl 300 mg aussieht und Inhalt der Packung

Cineol Pohl 300 mg sind längliche, naturfarbene Weichgelatine kapseln mit opaker Oberfläche.

Cineol Pohl 300 mg ist in Packungen mit 20, 50 und 100 magensaftresistenten Weichkapseln und als Klinikpackung mit 200 magensaftresistenten Weichkapseln erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Str. 11

25551 Hohenlockstedt

Tel.: (04826) 590

Telefax: (04826) 59109

E-Mail: info@pohl-boskamp.de

Internet: www.pohl-boskamp.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2018.

224800001/4

